

Proceso asistencial integrado enfermedade pulmonar obstrutiva crónica (EPOC).

Subprocesos ou itinerarios asistenciais.





Un click
enlaza co anexo ou
algoritmo correspondente

MODO DE UTILIZACIÓN

ÍNDICE

Un click nos
capítulos
enlaza coa páxina
correspondente

Algoritmo 01	DIAGNÓSTICO DO PACIENTE EPOC	Algoritmo 02	CLASIFICACIÓN E VALORACIÓN CLÍNICA DA EPOC	Algoritmo 03	TRATAMENTO FARMACOLÓXICO NA EPOC ESTABLE xeneralidades
Algoritmo 04	TRATAMENTO FARMACOLÓXICO NA EPOC ESTABLE segundo o fenotipo	Algoritmo 05	TRATAMENTO FARMACOLÓXICO NA EPOC ESTABLE segundo o fenotipo e niveis de gravidade	Algoritmo 06	TRATAMENTO FARMACOLÓXICO DAS COMORBILIDADES NA EPOC
Algoritmo 07	TRATAMENTO NON FARMACOLÓXICO NA EPOC ESTABLE	Algoritmo 08	EXACERBACIÓN NA EPOC: Diagnóstico, clasificación e valoración	Algoritmo 09	EXACERBACIÓN NA EPOC: Tratamento
Algoritmo 10	EXACERBACIÓN NA EPOC: Manexo en urxencias	Algoritmo 11	EXACERBACIÓN NA EPOC: Hospitalización convencional	Algoritmo 12	EXACERBACIÓN NA EPOC: Hado/hospital de día
Algoritmo 13	SEGUIMIENTO DO PACIENTE EPOC ESTABLE	Algoritmo 14	COIDADOS AO FINAL DA VIDA NO PACIENTE EPOC: Hado, coidados paliativos	Algoritmo 15	ATENCIÓN SOCIAL AO PACIENTE EPOC E/OU COIDADADOR
Anexo 01	CUESTIONARIO COPD-PS (Chronic Obstructive Pulmonary Disease-Population Screener)	Anexo 02	ALGORITMO DIAGNÓSTICO PARA A IDENTIFICACIÓN DOS FENOTIPOS NA EPOC	Anexo 03	ESCALA mMRC/CLASIFICACIÓN DO GRAO DE OBSTRUCCIÓN DA EPOC
Anexo 04	CUESTIONARIO CAT (COPD Assessment test)/ÍNDICE DE BODE/ÍNDICE DE BODEX	Anexo 05	FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	Anexo 06	CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO CONCERTADO DA EPOC ESTABLE
Anexo 07	CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA HOSPITALARIA DO PACIENTE EPOC	Anexo 08	CUESTIONARIO DE BARBER Detección de ancián de risco	Anexo 09	ÍNDICE DE BARTHEL
Anexo 10	ÍNDICE DE LAWTON & BRODY Actividades instrumentais da vida diaria	Anexo 11	ESCALA DE SOBRECARGA DO COIDADADOR Test de Zarit	Anexo 12	ESCALA DE VALORACIÓN SOCIO-FAMILIAR DE GIJÓN
Anexo 13	CUSTO ANUAL DO TRATAMENTO FARMACOLÓXICO DA EPOC				

Proceso asistencial integrado
Enfermedade pulmonar obstrutiva crónica _EPOC
Subprocesos ou itinerarios asistenciais



Un click nos pés de
páxina enlaza co
índice

PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA (EPOC).

Subprocesos ou itinerarios asistenciais.

Proceso
asistencial
integrado

Enfermidade pulmonar obstrutiva crónica _EPOC.

Subprocesos ou
itinerarios asistenciais.

Coordinación:

Dirección Xeral de
Asistencia Sanitaria

Subdirección Xeral de Planificación
e Programación Asistencial

Grupo de traballo:

Grupo de traballo EPOC

Integrantes do grupo de traballo

NOME	POSTO	CENTRO
D. Eladio Andión Campos	XEFE DE SERVIZO SUBDIRECCIÓN XERAL DE AVALIACIÓN ASISTENCIAL E GARANTÍAS	DIRECCIÓN XERAL DE ASISTENCIA SANITARIA
D.ª María Alcira Baleato Negreira	TRABALLO SOCIAL	XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE SANTIAGO
D.ª María José Bartolomé Domínguez	TÉCNICA SERVIZO DE PROCESOS E PROGRAMAS ASISTENCIAIS	DIRECCIÓN XERAL DE ASISTENCIA SANITARIA
D. Ciro Andrés Cabezas Checchi	DIRECTOR DE PROCESOS ASISTENCIAIS	XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE OURENSE, VERÍN E O BARCO
D.ª María Concepción Cruces Artero	MEDICINA FAMILIAR E COMUNITARIA	XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE VIGO
D. Alberto Fernández Villar	XEFE DE SERVIZO DE PNEUMOLOXÍA	XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE VIGO
D.ª María del Carmen González Vilas	FEA URXENCIAS	XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE PONTEVEDRA e O SALNÉS
D.ª Leticia Hermida Porto	HADO	XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DA CORUÑA
D.ª Mercedes Lanza Gándara	SUBDIRECTORA XERAL DE PLANIFICACIÓN E PROGRAMACIÓN ASISTENCIAL	DIRECCIÓN XERAL DE ASISTENCIA SANITARIA
D. Pedro Marcos Velázquez	XEFE DE SERVIZO DE PNEUMOLOXÍA	XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE OURENSE, VERÍN E O BARCO
D. Marcos Perdiguerro Veiga	FISIOTERAPIA	XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DA CORUÑA
D.ª Silvia Pérez Fernández	XEFA DE SECCIÓN DE MEDICINA INTERNA	XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE PONTEVEDRA e O SALNÉS
D. Antonio Pose Reino	XEFE DE SECCIÓN DE MEDICINA INTERNA	XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE SANTIAGO
D.ª Silvia Reboredo García	XEFA DE SERVIZO SUBDIRECCIÓN XERAL DE FARMACIA	DIRECCIÓN XERAL DE ASISTENCIA SANITARIA
D. Rafael Rodríguez Brea	TÉCNICO SERVIZO DE PROCESOS E PROGRAMAS ASISTENCIAIS	DIRECCIÓN XERAL DE ASISTENCIA SANITARIA
D.ª Eva Tizón Bouza	ENFERMEIRA	XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE FERROL
D. José Javier Ventosa Rial	XEFE DE SERVIZO DE PROCESOS E PROGRAMAS ASISTENCIAIS	DIRECCIÓN XERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Edita: Xunta de Galicia. Consellería de
Sanidade. Servizo Galego de Saúde

Lugar: Santiago de Compostela

Ano: 2013

Ilustración Portada_ Javier Ventosa

Deseño e maquetación_
KRISOLA DESEÑO, S.L.

Algoritmo 01

Páx 4

DIAGNÓSTICO DO PACIENTE EPOC

Algoritmo 02

Páx 5

CLASIFICACIÓN E VALORACIÓN CLÍNICA DA EPOC

Algoritmo 03

Páx 6

TRATAMENTO FARMACOLÓXICO NA EPOC ESTABLE xeneralidades

Algoritmo 04

Páx 7

TRATAMENTO FARMACOLÓXICO NA EPOC ESTABLE segundo o fenotipo

Algoritmo 05

Páx 8

TRATAMENTO FARMACOLÓXICO NA EPOC ESTABLE segundo o fenotipo e niveis de gravidade

Algoritmo 06

Páx 9

TRATAMENTO FARMACOLÓXICO DAS COMORBILIDADES NA EPOC

Algoritmo 07

Páx 10

TRATAMENTO NON FARMACOLÓXICO NA EPOC ESTABLE

Algoritmo 08

Páx 11

EXACERBACIÓN NA EPOC: Diagnóstico, clasificación e valoración

Algoritmo 09

Páx 12

EXACERBACIÓN NA EPOC: Tratamento

Algoritmo 10

Páx 13

EXACERBACIÓN NA EPOC: Manexo en urxencias

Algoritmo 11

Páx 14

EXACERBACIÓN NA EPOC: Hospitalización convencional

Algoritmo 12

Páx 15

EXACERBACIÓN NA EPOC: Hado/hospital de día

Algoritmo 13

Páx 16

SEGUIMIENTO DO PACIENTE EPOC ESTABLE

Algoritmo 14

Páx 17

COIDADOS AO FINAL DA VIDA NO PACIENTE EPOC: Hado, coidados paliativos

Algoritmo 15

Páx 18

ATENCIÓN SOCIAL AO PACIENTE EPOC E/OU COIDADADOR

Anexo 01

Páx 19

CUESTIONARIO COPD-PS (Chronic Obstructive Pulmonary Disease-Population Screener)

Anexo 02

Páx 20

ALGORITMO DIAGNÓSTICO PARA A IDENTIFICACIÓN DOS FENOTIPOS NA EPOC

Anexo 03

Páx 21

ESCALA mMRC/CLASIFICACIÓN DO GRAO DE OBSTRUCCIÓN DA EPOC

Anexo 04

Páx 22

CUESTIONARIO CAT (COPD Assessment test)/ÍNDICE DE BODE/ÍNDICE DE BODEX

Anexo 05

Páx 23

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA

Anexo 06

Páx 24

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO CONCERTADO DA EPOC ESTABLE

Anexo 07

Páx 25

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA HOSPITALARIA DO PACIENTE EPOC

Anexo 08

Páx 26

CUESTIONARIO DE BARBER Detección de ancián de risco

Anexo 09

Páx 27

ÍNDICE DE BARTHEL

Anexo 10

Páx 28

ÍNDICE DE LAWTON & BRODY Actividades instrumentais da vida diaria

Anexo 11

Páx 29

ESCALA DE SOBRECARGA DO COIDADADOR Test de Zarit

Anexo 12


Páx 30


ESCALA DE VALORACIÓN SOCIO-FAMILIAR DE GIJÓN

Anexo 13

Páx 31

CUSTO ANUAL DO TRATAMENTO FARMACOLÓXICO DA EPOC





PUNTOS CLAVE

- A vía de administración de elección para os broncodilatadores (BD) e corticoides inhalados (CI) é a inhalatoria
- A base do tratamento da EPOC estable son os broncodilatadores de longa duración (BDLD)
- Os fármacos que se lles deben engadir aos BDLD dependerán do fenotipo do paciente
- Fenotipo non agudizador, sexa enfisema ou bronquite crónica
 - BDLD en combinación con outros fármacos que diminúen o risco das exacerbacións
- Fenotipo mixto→BDLD combinados con CI
- Fenotipo agudizador con enfisema→BDLD aos que se lles pode engadir os CI e a teofilina segundo o nivel de gravidade
- Fenotipo agudizador con bronquite crónica→BDLD aos que se lles pode engadir CI, inhibidores da fosfodiesterasa-4 (IPD-4) ou mucolíticos segundo a gravidade ou en casos especiais antibióticos de forma preventiva
- Débeselles prestar especial atención ás comorbilidades e optimizar o seu control

PRINCIPAIS FÁRMACOS CON INDICACIÓN NA EPOC

1. **Broncodilatadores de acción curta (BDAC):**
 - **Anticolinérxicos (SAMA)** como o bromuro de ipratropio
 - **Agonistas β2 de acción curta (SABA)** como salbutamol ou terbutalina
2. **Broncodilatadores de longa duración (BDLD):**
 - **Anticolinérxicos (LAMA):** bromuro de tiotropio, bromuro de aclidinio e bromuro de glicopirronio
 - **β2- adrenérxicos (LABA):** salmeterol, formoterol e indacaterol
3. **Teofilinas**
4. **Corticoides inhalados (CI)**
5. **Inhibidores da fosfodiesterasa-4 (IPD-4):** roflumilast
6. **Mucolíticos:** carbocisteína
7. **Antibióticos**

DOSE E PRESENTACIÓN DOS PRINCIPAIS FÁRMACOS CON INDICACIÓN NA EPOC


Anexo 13

FAMILIA DE FÁRMACOS	FÁRMACO	PRESENTACIÓN	DOSE/INTERVALO	DURACIÓN
SABA	Salbutamol	ICP 100 µg/inh	200 µg/inh/4-6 h	3-6 h
	Terbutalina	TH 500 µg/inh	500 µg/inh/4-6 h	3-6 h
SAMA	Ipratropio	ICP 20 µg/inh	40-80 µg/inh/6 h	4-8 h
LABA	Salmeterol	ICP 25 µg/inh AH 50 µg/inh	50 µg/12h	12 h
	Formoterol	ICP 12 µg/inh TH 4,5-9 µg/inh AL 12 µg/inh NL 12 µg/inh	4,5-9- µg/12 h	12 h
	Indacaterol	BH 150-300 µg/inh	150-300 µg/24 h	24 h
	Tiotropio	AH 18 µg/inh RM 2,5 µg/inh	18 µg/24 h 5 µg/24 h	24 h
LAMA	Aclidinio	GN 322 µg/inh	322 µg/12 h	12 h
	Glicopirronio	BH 44 µg/inh	44 µg/24 h	24 h
	Salmeterol-Fluticasona	ICP 25/125, 25/250 AH 50/250, 50/500	50/250 µg/12 h 50/500 µg/12 h	12 h
LABA + CI	Formoterol- Budesonida	TH 4,5/160 TH 9/320	4,5/160 µg/12 h 9/320 µg/12 h	12 h
	Roflumilast	500 µg/v.o.	500 µg/24 h	24 h
IPD-4	Teofilina	100-375 mg v.o.	100-600 mg/24 h	24 h
MUCOLÍTICOS	Carbocistinato de lisina	2700 mg v.o.	2700 mg/24 h	24 h

→ AH: Accuhaler → AL: Aerolizer → NL: Novolizer → BH: Breezhaler → GN: Genuair → HA: Handihaler
→ ICP: Inhalador de cartucho presurizado → TH: Turbohaler → RM: Respimat Soft Mist → inh: inhalación
→ v.o.: vía oral → h: horas → µg: microgramos → mg: miligramos.

⁽¹⁾ Os obxectivos xerais do tratamento da EPOC resúmense en reducir os síntomas crónicos da enfermidade, diminuír a frecuencia e gravidade das agudizacións e finalmente mellorar o pronóstico. Débense alcanzar tanto os beneficios a curto prazo (control da enfermidade) como os obxectivos a medio e longo prazo (redución do risco).

(as recomendacións seguintes están baseadas na guía GesEPOC)



TRATAMENTO FARMACOLÓXICO NA EPOC ESTABLE segundo o fenotipo e niveis de gravidade

(as recomendacións seguintes están baseadas na guía GesEPOC)

Estadios de gravidade	A Fenotipo non agudizador	B Fenotipo mixto EPOC-Asma	C Fenotipo agudizador con enfisema	D Fenotipo agudizador con bronquite crónica
NIVEL I	LABA ou LAMA SABA ou SAMA	LABA + CI	LABA ou LAMA	LABA ou LAMA
NIVEL II	LABA ou LAMA LABA + LAMA	LABA + CI	LABA ou LAMA + CI LABA + LAMA LABA ou LAMA	LABA ou LAMA + CI ou Roflumilast LABA + LAMA LABA ou LAMA
NIVEL III	LABA + LAMA	LABA + LAMA + CI	LABA + LAMA + CI	LABA + LAMA + CI ou Roflumilast ± Carbocisteína
NIVEL IV	LABA + LAMA + Teofilina	LABA + LAMA + CI+ Teofilina ou Roflumilast (se bronquite crónica e agudizacións)	LABA + LAMA + CI ± Teofilina	LABA + LAMA + CI + Roflumilast ± Carbocisteína ± Teofilina ± Antibióticos
Todos	SABA ou SAMA (a demanda) + Deshabitución tabáquica + Vacinación + Actividade física + Rehabilitación			


Algoritmo 06
Tratamento farmacolóxico das comorbilidades na EPOC


Algoritmo 07
Tratamento non farmacolóxico na EPOC estable

Algoritmo
06

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DAS COMORBILIDADES NA EPOC

(as recomendacións seguintes están baseadas na guía GesEPOC)






EXACERBACIÓN NA EPOC: Diagnóstico, clasificación e valoración ⁽¹⁾

ESTABLECER DIAGNÓSTICO DE EXACERBACIÓN:

- **Diagnóstico previo de EPOC** (nos casos onde non se dispoña de espirometría recoméndase utilizar o termo posible exacerbación EPOC)
- **Empeoramento** mantido de síntomas respiratorios, especialmente aumento da dispnea, do volume e/ou da purulencia do esputo
- **Non ter recibido tratamento** para outra exacerbación nas últimas 4 semanas

Establecer a gravidade da exacerbación




⁽¹⁾ Exacerbación: cambio agudo na situación clínica basal do paciente máis alá da variabilidade diaria, que cursa con aumento da dispnea, expectoración ou purulencia ou calquera combinación de síntomas e que implica un cambio terapéutico.

⁽²⁾ Os criterios de exacerbación grave ou moi grave identifican risco de morte, mentres que os criterios que se utilizan para identificar exacerbación moderada están relacionados co risco de fracaso terapéutico.


NORMAS XERAIS DO TRATAMENTO:

- Manter o tratamento habitual
- Piar fundamental: optimizar tratamento con broncodilatadores de acción curta, aumentando a dose e/ou frecuencia
- Glicocorticoides e antibioterapia se existe indicación
- Revisión en 48-72 horas



⁽¹⁾ Criterios de Anthonisen: aumento da purulencia do esputo, do volume ou da dispnea.
⁽²⁾ A oxigenoterapia só como tratamento de urxencia se $SO_2 < 90\%$, administrado a baixas concentracións e como obxectivo saturacións de O_2 de 88-92%.


EXACERBACIÓN NA EPOC: Manexo en urxencias⁽¹⁾



⁽¹⁾ Indicacións para remitirle ao paciente EPOC para valoración hospitalaria: exacerbación grave o moi grave, fracaso terapéutico nas exacerbacións moderadas (falta de resposta ao tratamento), taquipnea >30 rpm e/ou frecuencia cardíaca >110 lpm que non remiten tras tratamento inicial de urxencia, pacientes con EPOC estable grave/moi grave e exacerbacións frecuentes (≥2) no ano previo, necesidade de descartar outros diagnósticos, apoio domiciliario insuficiente, deterioración do estado xeral.

⁽²⁾ Sistema Manchester de triaxe.


EXACERBACIÓN NA EPOC: Hospitalización convencional⁽¹⁾




⁽¹⁾ Criterios de ingreso hospitalario en sala de hospitalización: ausencia de melloría tras tratamento correcto e observación de 6-12 horas, acidose respiratoria ph <7.35, PaO2<55 mmHg, PaCO2>50 mmHg en pacientes sen hipercapnia previa, necesidade de VMNI, presenza de complicacións o comorbilidades graves (pneumo tórax, derramo pleural, amenia grave outras), soporte domiciliario insuficiente.


EXACERBACIÓN NA EPOC:

Hado/hospital de día






COIDADOS AO FINAL DA VIDA NO PACIENTE EPOC: Hado, cuidados paliativos



⁽¹⁾ O uso de fentanilo transdérmico tamén pode ser moi útil se a vía oral non é posible





1 Durante as últimas 4 semanas, cantas veces sentiu que lle faltaba o alento?

Nunca	Poucas veces	Algunhas veces	A maioría das veces	Todo o tempo
☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 2

2 Algunha vez expulsa algo ao tusir, como mucosidade ou flegma?

Non nunca	Só con arrefriados ou infeccións do peito ocasionais	Si, algúns días do mes	Si, case todos os días da semana	Si, todos os días
☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 1	☐ 2

3 Durante o último ano reduciu as súas actividades cotiás debido aos seus problemas respiratorios?

Non en absoluto	Case nada	Non estou seguro/a	Si	Si, moito
☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2

4 Fumou polo menos 100 cigarros en TODA a SÚA VIDA?

Non	Si	Non sei
☐ 0	☐ 2	☐ 0

5 Cantos anos ten?

De 35 a 49 anos	De 50 a 59 anos	De 60 a 69 anos	De 70 en diante
☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 2

Suma a puntuación de cada unha das súas respostas (anote, a continuación, o número que figura ao lado de cada unha delas) e anote o resultado final.

	+		+		+		+		=	
Resposta 1		Resposta 2		Resposta 3		Resposta 4		Resposta 5		Resultado total

- Se o resultado é **≥ de 4** é probable que teña enfermidade pulmonar obstrutiva crónica (EPOC). Consulte co seu médico.
- Se o resultado está entre **0 e 3** pero ten problemas respiratorios consulte co seu médico.


⁽¹⁾ Adaptado ao castelán e traducido ao galego.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO PARA A IDENTIFICACIÓN DOS FENOTIPOS NA EPOC ⁽¹⁾



Algoritmo
02

Anamnese + Probas complementarias iniciais
(espirometría con PBD, Rx tórax postero anterior e lateral, analítica)



⁽¹⁾ Fonte GesEPOC e traducido ao galego.

ESCALA mMRC/ CLASIFICACIÓN DO GRAO DE OBSTRUCCIÓN DA EPOC




Algoritmo
02

Escala de dispnea modificada do MRC (Fonte GesEPOC e traducida ao galego)

	ACTIVIDADE
GRAO 0	Ausencia de dispnea ao realizar exercicio intenso.
GRAO 1	Dispnea ao andar á présa en chairro, ou ao andar subindo unha pendente pouco pronunciada.
GRAO 2	A dispnea prodúcelle unha incapacidade de manter o paso doutras persoas da mesma idade camiñando en chan ou ter que parar a descansar ao andar en chan ao propio paso.
GRAO 3	A dispnea fai que teña que parar a descansar ao andar uns 100 metros ou despois de poucos minutos de andar en chan.
GRAO 4	A dispnea impídelle ao paciente saír da casa ou aparece con actividades como vestirse ou espirse.

Clasificación do grao de obstrución da EPOC (Fonte Gold e traducida ao galego)



QUESTIONARIO CAT (COPD Assessment test) / ÍNDICE DE BODE / ÍNDICE DE BODEX



Algoritmo
02

Questionario CAT (traducido ao galego)

Eu nunca tuso	0	1	2	3	4	5	Tuso todo o tempo
Non teño flegma (moco no peito)	0	1	2	3	4	5	Teño o peito cheo de flegma (moco)
Non sinto o peito apertado	0	1	2	3	4	5	Sinto o peito apertado
Non me falta o alento ao subir pendentes ou escaleiras	0	1	2	3	4	5	Fáltame o alento ao subir pendentes ou escaleiras
Non teño limitación para tarefas do fogar	0	1	2	3	4	5	Estou totalmente limitado para as tarefas do fogar
Non teño problemas para saír da miña casa	0	1	2	3	4	5	Non me sinto seguro para saír da miña casa
Durmo profundamente	0	1	2	3	4	5	O meu problema respiratorio impídeme durmir
Teño moita enerxía	0	1	2	3	4	5	Non teño nada de enerxía

CAT COPD Assessment Test [sede web]. Middlese: GlaxoSmithKline, 2009. [Actualizada o 10 de xuño de 2013; Accedida el 8 de outubro de 2013]. Disponible en: <http://www.catestonline.org/>

Índice de BODE (fonte GesEPOC e traducida ao galego)

MARCADORES		PUNTUACIÓN			
		0	1	2	3
B	IMC	>21	≤21		
O	FEV1(%)	≥65	50-64	36-49	≤35
D	Dispnea (mMRC)	0-1	2	3	4
E	6MM (m)	≥350	250-349	150-249	≤149

→ **IMC**: índice de masa corporal → **mMRC**: escala modificada da MRC → **6MM**: distancia percorrida na proba dos 6 minutos marcha.

→ Puntuacións BODE mais altas indican maior risco clínico

→ Proposto por Celli et al.

Índice de BODEX (fonte GesEPOC e traducida ao galego)

MARCADORES		PUNTUACIÓN			
		0	1	2	3
B	IMC (kg/m ²)	>21	≤21		
O	FEV1(%)	≥65	50-64	36-49	≤35
D	Dispnea (mMRC)	0-1	2	3	4
Ex	Exacerbacións graves	0	1-2	≥3	

→ **IMC**: índice de masa corporal → **mMRC**: escala modificada da MRC → **Ex**: exacerbacións graves (inclúense unicamente visitas a urxencias hospitalarias ou ingresos).

→ **Índice de BODEX**, unicamente para os niveis I e II (EPOC leve ou moderado). Todos os pacientes que teñan un **BODEx ≥ 5 puntos**, deberán realizar a proba de exercicio para precisar o seu nivel de gravidade.

→ Proposto por Soler-Cataluña et al.



Algoritmo
07

**Control da
respiración**
10 minutos,
2 veces ao día

**Limpeza de
secrecións**
de 5 a 10 minutos


Actividade física
30 minutos ao día

Posición deitado



- Coloque as palmas das mans completamente relaxadas sobre o abdome.
- Inspire con tranquilidade a través do nariz, inchando ao mesmo tempo o abdome (onde están as súas mans), manteña o aire dentro 1 ou 2 segundos, saque o aire lentamente pola boca cos labios pregados (tratando de sacar todo o aire).

Posición de sentado




Poña as mans sobre os xeonllos cruzándoas:

- Inspire polo nariz e, ao mesmo tempo, suba os brazos formando un "V" con eles.
- Expire pola boca cos labios pregados, e baixe lentamente os brazos ata volver poñer as mans cruzadas sobre os seus xeonllos.
- Repita varias veces o exercicio.



- Coa tose, límpanse as vías respiratorias.
- Para que a tose sexa eficaz, debe coller aire profundo e soltalo forte nun ou dous golpes de tose.
- Beba 1.5 litros de auga ao día.




Subir escaleiras:

1. Póñase diante do primeiro chanzo e tome aire pola nariz.
2. Suba os chanzos que poida (1, 2 ou 3) soprando.
3. Pare e tome aire polo nariz.
4. Siga subindo e sopre (1, 2 ou 3).



- Agora coloque as súas mans nas últimas costelas preto da cintura.
- Inspire con tranquilidade polo nariz para que se inchen os seus costados (onde ten as mans).
- Manteña o aire dentro 1 ou 2 segundos, saque o aire pola boca lentamente, cos labios pregados, ata que non lle quede nada; notará que os costados se desinchan.



Poña a man dereita sobre o seu ombro dereito dobrando o cóbado.

- Mentres saca o aire cos labios pregados, baixe o tronco ata apoiar o cóbado sobre o xeonllo esquerdo.
- Ao inspirar pola nariz, suba o cóbado cara a arriba e atrás.
- Repita varias veces co seu brazo dereito.
- Despois dun descanso, faga o mesmo co seu brazo esquerdo.

- Camiñar todos os días
- Respirar lentamente
- Encher e baleirar completamente os pulmóns
- Repetir 10 veces cada exercicio

⁽¹⁾ Fonte "Área de Enfermería y Fisioterapia, con la colaboración Área Irtis (SEPAR)" e traducido ao galego.

Dispoñible en: http://sear.es/libro_epoc.pdf

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA HOSPITALARIA DO PACIENTE EPOC



Algoritmo
13



- ☐ Dúbdas relacionadas co diagnóstico, nivel de gravidade ou tratamento
- ☐ Síntomas desproporcionados en relación coas alteracións funcionais
- ☐ EPOC en menores de 40 anos
- ☐ Pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina
- ☐ Presenza de bullas ou enfisema
- ☐ Falta de resposta ao tratamento
- ☐ Tratamento avanzado do tabaquismo en pacientes que reúnan criterios de derivación
- ☐ Exacerbacións¹ frecuentes (2 ou máis, no último ano)
- ☐ Descenso rápido do FEV1 (>100 cc/ano)
- ☐ Sospeita de SAOS
- ☐ Hemoptise
- ☐ Pacientes con rápida deterioración da función pulmonar
- ☐ Presenza de cor pulmonale
- ☐ Se non é posible realizar a proba da marcha e é necesario calcular o índice BODE



Valoración de:

- ☐ Oxigenoterapia domiciliaria
- ☐ Rehabilitación pulmonar
- ☐ Cirurxía (bullectomía, redución de volume, transplante)
- ☐ Ventilación mecánica non invasora (VMNI)
- ☐ Uso de nebulizadores en domicilio



É recomendable que acuda á dita consulta coas seguintes probas complementarias recentes:

- ☐ ECG
- ☐ Espirometría con proba broncodilatadora
- ☐ Analítica básica
- ☐ Radiografía de tórax se non demora innecesariamente a consulta

⁽¹⁾ Exacerbación: cambio agudo na situación clínica basal do paciente máis alá da variabilidade diaria, que cursa con aumento da dispnea, expectoración ou purulencia ou calquera combinación de síntomas e que implica un cambio terapéutico.

CUESTIONARIO DE BARBER⁽¹⁾

Detección de ancián de risco

Nome: _____ Idade: _____ Data: _____

1	Vive só?	
2	Encóntrase sen ninguén a quen acudir se precisa axuda?	
3	Necesita de alguén a miúdo?	
4	Hai máis de 2 días á semana que non come quente?	
5	Impídelle a súa saúde saír á rúa?	
6	Ten a miúdo problemas de saúde que lle impiden valerse por si mesmo?	
7	Ten dificultades coa vista para realizar os seus labores habituais?	
8	Suponlle moita dificultade a conversación porque oe mal?	
9	Estivo ingresado no hospital no último ano?	

Valoración

→ Un resultado positivo nalgunha das preguntas, indica un resultado desfavorable.

⁽¹⁾ Traducido ao galego

ÍNDICE DE BARTHEL ⁽¹⁾

Anotar, coa axuda do coidador principal, cal é a situación persoal do paciente, con respecto a estas 10 preguntas de **actividades básicas da vida diaria**.

ÍTEM	ACTIVIDADE BÁSICA DA VIDA DIARIA	PUNTOS
Comer	Totalmente independente	10
	Necesita axuda para cortar carne, o pan etc.	5
	Dependente	0
Lavarse	Independente, entra e sae só do baño	5
	Dependente	0
Vestirse	Independente. Capaz de poñer e quitar a roupa, abotoarse, atar os zapatos	10
	Necesita axuda	5
	Dependente	0
Arranxarse	Independente para lavar a cara, as mans, peitearse, afeitarse, maquillarse etc.	5
	Dependente	0
Deposicións*	Continente	10
	Ocasionalmente, algún episodio de incontinencia ou necesita axuda para administrarse supositorios ou lavativas	5
	Incontinencia	0
Micción*	Continente ou é capaz de coidar da sonda	10
	Ocasionalmente, máximo un episodio de incontinencia en 24 horas, necesita axuda para coidar da sonda	5
	Dependente	0
Usar o retrete	Independente para ir ao retrete, quitar e poñer a roupa	10
	Necesita axuda para ir ao retrete, pero límpase só	5
	Dependente	0
Trasladarse	Independente para ir do sofá á cama	15
	Mínima axuda física ou supervisión	10
	Grande axuda pero é capaz de manterse sentado sen axuda	5
	Dependente	0
Deambular	Independente, camiña só 50 m	15
	Necesita axuda física ou supervisión para camiñar 50 m	10
	Independente en cadeira de rodas sen axuda	5
	Dependente	0
Chanzos	Independente para subir e baixar escaleiras	10
	Necesita axuda física ou supervisión	5
	Dependente	0
TOTAL		

* Micción e deposición: valorar a semana previa.

RESULTADO

< 20 Dependente total
 20-35 Dependente grave
 40-55 Dependente moderado
 ≥ 60 Dependente leve
 100 = Independente

→ **Máxima puntuación: 100 puntos**
(90 en caso de ir con cadeira de rodas)

ÍNDICE DE LAWTON & BRODY ⁽¹⁾

Actividades instrumentais da vida diaria

Teléfono		HOMES	MULLERES
	Utilizar o teléfono por propia iniciativa, buscar e marcar os números	1	1
	Sabe marcar números coñecidos	1	1
	Contesta ao teléfono, pero non sabe marcar	1	1
	Non utiliza o teléfono en absoluto	0	0
Compras			
	Realiza todas as compras necesarias de xeito independente	1	1
	Só sabe facer pequenas compras	0	0
	Ha de ir acompañado para calquera cousa	0	0
	Completamente incapaz de facer a compra	0	0
Preparación da comida			
	Organiza, prepara e serve calquera comida por si só/soa	-	1
	Prepara a comida só se se lle proporcionan os ingredientes	-	0
	Prepara, quenta e serve a comida, pero non segue unha dieta axeitada	-	0
	Necesita que o preparen e lle sirvan a comida	-	0
Tarefas domésticas			
	Realiza as tarefas da casa por se soa, só axuda ocasional	-	1
	Realiza as tarefas lixeiras (fregar pratos, camas...)	-	1
	Realiza tarefas lixeiras, pero non mantén un nivel de limpeza axeitado	-	1
	Necesita axuda, pero realiza as tarefas domésticas	-	1
	Non participa nin fai ningunha tarefa	-	0
Lavar a roupa			
	Lava soa toda a roupa	-	1
	Lava só pezas pequenas (calcetíns, medias etc)	-	1
	A roupa tena que lavar outra persoa	-	0
Transporte			
	Viaxa por si só/soa, utiliza transporte público/conduce coche	1	1
	Pode ir só en taxi, non utiliza outro transporte público	1	1
	Só viaxa en transporte público se vai acompañado	1	1
	Viaxes limitadas en taxi ou coche con axuda doutros (adaptado)	0	0
	Non viaxa en absoluto	0	0
Responsabilidade respecto á medicación			
	É capaz de tomar a medicación á hora e na dose correcta, só/soa	1	1
	Toma a medicación só se lle preparan previamente	0	0
	Non é capaz de tomar a medicación só/soa	0	0
Capacidade de utilizar diñeiro			
	Responsabilízase de asuntos económicos só/soa	1	1
	Encárgase de compras diarias, pero necesita axuda para ir ao banco	1	1
	Incapaz de utilizar o diñeiro	0	0

INTERPRETACIÓN

8 puntos

Independente

0 puntos

Máxima dependencia

ESCALA DE SOBRECARGA DO COIDADADOR

Test de Zarit ⁽¹⁾

ÍTEM	PREGUNTA QUE SE VAI REALIZAR	PUNTUACIÓN
1	Sente que o seu familiar solicita máis axuda da que necesita?	
2	Sente que debido ao tempo que lle dedica ao seu familiar xa non dispón de tempo abondo para vostede?	
3	Séntese tenso cando ten que coidar o seu familiar e atender ademais outras responsabilidades?	
4	Séntese avergonzado pola conduta do seu familiar?	
5	Séntese enfadado cando está preto do seu familiar?	
6	Cre que a situación actual afecta de xeito negativo a súa relación con amigos e outros membros da súa familia?	
7	Sente temor polo futuro que lle espera ao seu familiar?	
8	Sente que o seu familiar depende de vostede?	
9	Séntese sufocado cando ten que estar xunto ao seu familiar?	
10	Sente que a súa saúde se resentiu por coidar o seu familiar?	
11	Sente que non ten a vida privada que desexaría debido ao seu familiar?	
12	Cre que a súa vida social se viu afectada por ter que coidar do seu familiar?	
13	Séntese incómodo para invitar amigos á casa a causa do seu familiar?	
14	Cre que o seu familiar espera que vostede o coide coma se fose a única persoa coa que pode contar?	
15	Cre que non dispón de diñeiro abondo para coidar ademais dos seus outros gastos?	
16	Sente que será incapaz de coidar o seu familiar por moito máis tempo?	
17	Sente que perdeu o control sobre a súa vida dende que a enfermidade do seu familiar se manifestou?	
18	Desexaría poder encargar o coidado do seu familiar a outras persoas?	
19	Séntese inseguro sobre o que debe facer co seu familiar?	
20	Sente que debería facer máis do que fai polo seu familiar?	
21	Cre que podería coidar do seu familiar mellor do que o fai?	
22	En xeral séntese moi sobrecargado por ter que coidar do seu familiar?	

Puntuación de cada ítem (sumar todos para o resultado)

FRECUENCIA	PUNTUACIÓN
Nunca	0
Case nunca	1
Ás veces	2
Bastantes veces	3
Case sempre	4

INTERPRETACIÓN

<47

Non sobrecarga

47 a 55

Sobrecarga leve

> 55

Sobrecarga intensa

ESCALA DE VALORACIÓN SOCIO-FAMILIAR DE GIJÓN ⁽¹⁾

Situación familiar

1. Vive con familia sen dependencia físico/psíquica.
2. Vive con cónxuxe de similar idade.
3. Vive con familia e/ou cónxuxe e presenta algún grao de dependencia.
4. Vive só e ten fillos próximos.
5. Vive só e carece de fillos ou viven afastados.

Situación económica

1. Máis de 1,5 veces ou salario mínimo.
2. Dende 1,5 veces ou salario mínimo ata o salario mínimo exclusivamente.
3. Dende o salario mínimo ata pensión mínima contributiva.
4. LISMI-FAS-Pensión non contributiva.
5. Sen ingresos ou inferiores ao apartado anterior.

Vivenda

1. Axeitada ás necesidades.
2. Barreiras arquitectónicas na vivenda ou portal da casa (chanzos, portas estreitas, baños...).
3. Humidades, mala hixiene, equipamento inadecuado (sen baño completo, auga quente, calefacción).
4. Ausencia de ascensor, teléfono.
5. Vivenda inadecuada (choupanas, vivenda declarada en ruína, ausencia de equipamentos mínimos).

Relacións sociais

1. Relacións sociais.
2. Relación social só con familia e veciños.
3. Relación social só con familia ou veciños.
4. Non sae do seu domicilio, recibe familia.
5. Non sae, non recibe visitas.

Apoios rede social

1. Con apoio familiar ou veciñal.
2. Voluntariado social, axuda domiciliaria.
3. Non ten apoio.
4. Pendente de ingreso en residencia xeriátrica.
5. Ten coidados permanentes.

Puntuación final

- <10 puntos
→ normal ou risco social baixo
- 10-16 puntos
→ risco social intermedio
- >17 puntos
→ risco social elevado
(problema social)

CUSTO ANUAL DO TRATAMENTO FARMACOLÓXICO DA EPOC



Algoritmo 03

- O gasto en medicamentos para patoloxía broncopulmonar creceu de forma considerable en Galicia. Durante os últimos anos as asociacións de CI e broncodilatadores de longa duración ocuparon os 2 primeiros postos no ránking de gasto en receita da nosa comunidade, chegando a supoñer un 5,83% do gasto en receita cun importe total de 47,7M€ no ano 2012.
- A continuación mostramos unhas táboas cos principios activos, os dispositivos de inhalación dispoñibles, e o custo das presentacións comercializadas con doses autorizadas no tratamento da EPOC. Esta información complementaria servirá como unha ferramenta orientada á optimización do uso dos recursos, para facilitar unha selección eficiente dos tratamentos e intervencións nas que o balance custo-efectividade sexa positivo.

CUSTO ANUAL LABA(€)

HIROBRIZ BREEZHALER 150MCG/300 MCG →30 cápsulas duras po inhalación		601,56
OSLIF BREEZHALER 150MCG/300 MCG →30 cápsulas + inhalador po inhalación	INDACATEROL BREEZHALER	601,56
ONBREZ BREEZHALER 150MCG/300MCG →30 cápsulas duras po inhalación		601,56
BETAMICAN ACCUHALER 50MCG →1 dispositivo x 60 alvéolos po inhalación	SALMETEROL ACCUHALER	464,40
INASPIR ACCUHALER 50MCG →60 alvéolos po para inhalación		464,40
SEREVENT ACCUHALER 50MCG →60 alvéolos po para inhalación		445,08
BEGLAN ACCUHALER 50MCG →1 accuh + 1 tira 60 alvéolos po para inhalación		427,32
BETAMICAN 25MCG→1 inh x 120 aplicac. suspensión inhalación envase		443,76
INASPIR 25MCG →Suspensión inhalación envase a presión 120 aplicaciónes		443,76
SEREVENT 25MCG →Suspensión para inhalación en envase presión 120...	ICP	425,04
BEGLAN 25MCG →Suspension, inhalacion envase presión 120 aplicaciónes		407,64
OXIS TURBUHALER 9MCG PO INHALACIÓN→1 X 60 doses	FORMOTEROL TURBUHALER	368,28
FORADIL NEO 12MCG→50 doses soluc. Inhalación envase a presión		320,16
BRONCORAL NEO 12MCG/PUL SOL INHA ENV PRES→50 doses		320,16
FORMATRIS NOVOLIZER 12MCG/DOS→1 cartucho 60 doses po inhalación		316,80
BRONCORAL AEROLIZER 12MCG→60 cápsulas po inhalación		386,52
FORADIL AEROLIZER 0,012MG→60 cápsulas inhalación		386,52
NEBLIK 0,012MG/CAP→60 cápsulas po inhalación		386,52
FORMOTEROL STADA 12MCG →60 cápsulas po inhalación		270,48
FORMOTEROL ALDO-UNIÓN 12MCG →60 cápsulas po inhalación		276,12

CUSTO ANUAL LAMA (€)

SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG SOLUCIÓN INHALACIÓN → 1 Inhalador + 1...	TIOTROPIO	633,12
SPIRIVA 18MCG/CÁPS → 30 Cáps. + 1 Dispositivo handihaler inhalador		588,72
SEEBRI BREEZHALER 44MCG PO INHAL → 5 Blisters 6 Cáps (30 Cap) + Inhalador	GLICOPIRRONIO	571,32
BRETARIS GENUAIR → 60 Doses	ACLDINIO	571,32
EKLIRA GENUAIR 322MCG → 1 Inhalador con 60 doses po para inhalación		571,32



CUSTO ANUAL CI+BDLD (€)

PLUSVENT ACCUHALER 50/500MCG → 60 Alvéolos po para inhalación	FLUTICASONA + SALMETEROL	ACCUHALER	996,36
BRISAIR ACCUHALER 50MCG/500MCG → 60 Alvéolos po para inhalación			996,36
INALADUO 50/500MCG ACCUHALER → 60 Alvéolos po inhalación			996,36
ANASMA 50/500 ACCUHALER → 60 Alvéolos po inhalación			996,36
SERETIDE ACCUHALER 50MCG/500MCG → 60 Alvéolos po para inhalación			996,36
PLUSVENT 25/250MCG → 120 Doses suspensión inhalación	FLUTICASONA + SALMETEROL	ICP	976,56
INALADUO 25/250MCG SUSPENSIÓN PARA INHAL → 1 Inhalador 120 aplicaciones			976,56
BRISAIR 25MCG/250MCG SUSPEN INHALAC → Envase a presión 120 aplicaciones			976,56
SERETIDE 25MCG/250MCG SUSP INHALAC → Envase a presión 120 aplicaciones			976,56
ANASMA 25/250MCG SUSPEN INHALAC → Envase a presión inhalador 120 doses			976,56
PLUSVENT ACCUHALER 50/250MCG → 60 Alvéolos po para inhalación	FLUTICASONA + SALMETEROL	ACCUHALER	738,24
BRISAIR ACCUHALER 50MCG/250MCG → 60 Alvéolos po para inhalación			738,24
INALADUO 50/250MCG ACCUHALER → 60 Alvéolos po para inhalación			738,24
ANASMA ACCUHALER 50/250MCG → 60 Alvéolos po para inhalación			738,24
SERETIDE ACCUHALER 50MCG/250MCG → 60 Alvéolos po para inhalación			738,24
SYMBICORT FORTE TURBUHALER 320/9MCG → 60 Doses po para inhalación	BUDESONIDA + FORMOTEROL	TURBUHALER	776,64
RILAST FORTE TURBUHALER 320/9MCG → 60 Doses po para inhalación			776,64
RILAST TURBUHALER 160/4,5MCG → 120 Doses po para inhalación			776,64
SYMBICORT TURBUHALER 160/4,5MCG → 120 Doses po para inhalación			776,64

CUSTO ANUAL CI (€)

FLIXOTIDE 0,25 MG/INH → 120 Doses	FLUTICASONA	ICP	629,64
FLUSONAL 250MCG → 120 Aplicaciones suspensión inhalación, envase a presión			629,64
INALACOR 250MCG → Suspensión inhal, envase a presión 1 Inhal+Cartucho 120 doses			629,64
TRIALONA 250MCG → Suspensión inhalación, envase a presión 120 aplicaciones			629,64
FLIXOTIDE 500 ACCUHALER 0,5MG/ALV → 60 Alvéolos inhalación			629,64
FLUSONAL ACCUHALER 500MCG → 60 Alvéolos po para inhalación	FLUTICASONA	ACCUHALER	629,64
INALACOR ACCUHALER 500MCG → Po inhalación pre-dispensado 60 doses			629,64
TRIALONA ACCUHALER 500MCG → 1 Dispositivo X 60 alvéolos po inhalación			629,64
PULMICORT TURBUHALER 400MCG/DOS → 100 Doses po			232,32
NOVOPULM NOVOLIZER 400MCG → 100 Doses+ 1 inhalación po			230,08
BUDESONIDA EASYHALER 400MCG → 100 Doses po para inhalación	BUDESONIDA	AEROLIZER	216,32
MIFLONIDE 400MCG → 60 Cápsulas duras po inhalación			222,00
MIFLONIDE 400MCG → 120 Cápsulas duras po inhalación			203,16
RIBUJET 0,2MG/DOSES → 200 Doses inhalación Buc 5ml			178,80
OLFEX BUCAL 200MCG/DOSES → 200 Doses 10ml aerosol			178,80
BUDESONIDA ALDO UNION 200MCG → 200 Doses 10ml	BECLOMETASONA	ICP	162,00
BECLOFORTE 250MCG → soluc inhalación envase presión 1 cartucho 200 doses			151,84

CUSTO ANUAL DO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA EPOC



Algoritmo
03

CUSTO ANUAL ROFLUMILAST(€)

LIBERTEK 500MCG → 30 comprimidos recubertos con película

694,08

DAXAS 500MCG → 30 comprimidos recubertos con película

694,08



Servizo Galego
de Saúde



Asistencia Sanitaria

Procesos

20
D



XUNTA
DE GALICIA